

LYNPARZA (Olaparib)

Votre médicament sous forme de gélule ne sera plus commercialisé à partir du 31 mars 2021, seule la forme comprimé restera disponible

Ce document vous est remis pour **vous accompagner dans ce changement et limiter le risque de confusion entre les deux formes gélule et comprimé**, qui vont co-exister jusqu'à cette date.

PASSER DE LA FORME GELULE A LA FORME COMPRIME : PRECAUTIONS A PRENDRE

Les deux formes pharmaceutiques de Lynparza, **gélule et comprimé, ne sont pas interchangeables** sur une base de milligramme à milligramme, c'est-à-dire que pour une même quantité de substance active les effets sont différents.

Si vous êtes traité(e) par Lynparza gélule, votre cancérologue peut vous prescrire la forme comprimé, dosé à 100 mg ou 150 mg.

Dans ce cas des précautions sont à prendre car les doses et les conditions d'utilisation pour les comprimés et les gélules sont différentes. **Votre cancérologue devra vous expliquer quelles sont les nouvelles modalités de prise des comprimés.**

Attention : toute confusion entre les modalités de prise des gélules et des comprimés peut diminuer l'efficacité du traitement et vous exposer à davantage d'effets indésirables.

Afin d'éviter toute erreur de traitement :

- ◆ Vérifiez que la forme comprimé et le dosage 100 mg ou 150 mg figurent sur votre ordonnance.
- ◆ Assurez-vous lors de la dispensation en pharmacie qu'il s'agit de la bonne forme et de la bonne dose.
- ◆ Ne commencez pas à prendre les comprimés avant d'avoir terminé votre plaquette de gélules (sauf si votre cancérologue vous a indiqué le contraire et, dans ce cas, rapportez les gélules en pharmacie).

CE QUI CHANGE AVEC LA FORME COMPRIME

- ◆ **La couleur :**
 - Les gélules sont blanches,
 - Les comprimés de 150 mg sont vert-gris,
 - Les comprimés de 100 mg sont jaunes.
- ◆ **La dose :**
 - **Avec les comprimés il y a moins de prise chaque jour** car les doses quotidiennes sont différentes entre les 2 formes. La diminution du nombre de prises du médicament chaque jour améliore votre quotidien.
- ◆ **Les horaires :**
 - **Les comprimés peuvent être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas, contrairement aux gélules**, ce qui limite les contraintes.
- ◆ **La conservation :**
 - **Les comprimés se conservent à température ambiante**, contrairement aux gélules qui devaient être conservées au réfrigérateur ou jusqu'à 3 mois à une température ne dépassant pas 30°C.

L'efficacité et la tolérance de ces deux formes pharmaceutiques sont inchangées. Si toutefois vous observez une différence, rapprochez-vous de votre cancérologue ou de votre pharmacien.

➔ Pour déclarer tout effet indésirable :
www.signalement-sante.gouv.fr

➔ Pour vous informer sur les médicaments :
www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr